+ + mou

Observation de Monsieur Pineau m.tre Chirurgien Et de Lhotel dieu de Melun n°. 42.

En Lannée 1751 on Emmena a Lhotel dieu vn homme agé de 49 ans qui avoit Eté Enterré sous la Chutte d'une Carriere y travaillant, il avoit le tibia Et le peroné de la jambe droite fracturé avec Esquilles dans leurs parties moyenes, vne tumeur grosse comme la teste d'un Enfant de 4 ans a la même partie Et playe dans sa partie interne+ tout le Corps de la jambe d'une grosseur prodigieuse, J'ouvrois la tumeur dans son Etenduë j'en tiray le sang Coagulé Et les Esquilles detachées, je le panceay les premiers jours avec la seconde Eau vulneraire dans laquel je trempay mes bourdonnets Et compresses, le bandage a 18 chefs arrosé aussy de cette liqueur Et moderement serré, il luy survint au bout de deux jours vn Eresipel depuis le sommet de la teste jusqua l'extremité des doigts des mains Et des pieds, les accidents furent grands, comme rougeur, Enflure, la fievre continue, flux de ventre, legere transport, la vuë interdite par le gonflement des jouës Et des paupieres,, ces accidens ont durés jusquau cinquantiesme jour, il fut saigné dans les premiers jours Et dans le cours de sa maladie dix fois,, malgré la supuration qui Etoit tres abondante, je fis bassiner L'Eresipel avec l'eau de vie camphrée, je panceay ~~la~~

+ par où il Etoit sortit vne grande quantité de sang

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 31 d. 2 n°42

eV. 25

les playes avec le Strrap dissout dans ~~le~~ cette même liqueur a cause de la mortification qui Etoit toujours pret a Survenir, mon bandage moderemment serré, Et la Jambe Soutenue par les fanons Et le drap roulé, les matieres a la fin Sont devenue plus abondantes Et louable, tous ces grands accidens ont cessé, les os Se Sont Exfoliées principalement toute la face interne du tibia depuis Sa partie Superieure Jusqua l'inferieure, le malade a Eté parfaitement guery En quatre mois Sans incomodité, a l'exception d'une difformité grosse comme un petit œuf de poule qui vient du Cal du peroné dans la partie moyene Et Externe de la Jambe